

Подготовка к радиоизотопным методам исследования.

Перфузионная сцинтиграфия миокарда (в покое) – подготовки не требуется. Рекомендуется легкий завтрак (слизистая каша).

Перфузионная сцинтиграфия миокарда (с нагрузкой) – прием препаратов короткого действия (антагонисты Са, нитраты) следует прекратить за 24ч. до исследования, медикаментов с пролонгированным антиангинальным эффектом (β -блокаторы, ретардные формы антагонистов Са) – за 24часа.

Динамическая нефросцинтиграфия с непрямой ангиографией – прием гипотензивных препаратов прекращают накануне вечером, если это возможно. Рекомендуется обычный легкий завтрак, чай. Перед исследованием опорожнить мочевой пузырь.

При проведении каптоприловой пробы за несколько дней отменяют диуретики из-за опасности развития гипотензии после приема каптоприла.

Сцинтиграфия легких, ОФЭКТ легких – подготовки не требуется.

Сцинтиграфия щитовидной железы – отмена препаратов, содержащих йод (раствор Люголя, накожное применения р-ра йода), бром (седативные микстуры); отмена гормональных препаратов (тиреоидные гормоны, кортикостероиды), антитиреоидных препаратов (мерказолил, перхлорат калия...). Исследование щитовидной железы проводится натощак.